



*Rosa Indica Stelligera.*

*P. A. Redouté pinx.*

*Le Bengale Étoile.*

*Imprimerie de Renouard.*

*Chapoy sculp.*

## LES ROSES.

41

### ROSA INDICA STELLIGERA.<sup>(1)</sup>

*R. germinibus oblongo-ovatis pedunculisque glabris; petiolis aculeatis; petalis bicoloribus, caule subinermi. (N.)*

### LE BENGAL ÉTOILE.

#### DESCRIPTION.

Petit arbrisseau qui ne s'élève guère qu'à huit ou dix pouces. Il présente un buisson assez touffu, dont les branches sont, presque toujours, dépourvues d'aiguillons; parfois, cependant, on en trouve un ou deux à la base de ceux des rameaux principaux qui sont le plus rapprochés du sol. Les feuilles se composent de trois ou de cinq folioles arrondies à la base, et pointues au sommet, glabres et d'un vert clair en-dessus, plus pâles et quelquefois couvertes, en partie, d'une teinte rougeâtre en-dessous et sur la bordure: elles sont portées par un pétiole coloré, un peu hispide, garni de quelques aiguillons, ayant à sa base deux stipules, bifides, pointues au sommet, denticulées en leur bord. Les fleurs naissent solitaires à l'extrémité des rameaux. Le tube du calice est ovoïde et glabre; le pédoncule est également glabre. Les divisions du

(1) *Habitus.* Fruticulus humilis, circiter pedalis, rarissime aculeatus. Foliola quina, etiam terna, ovalia, basi rotundata, apice acuta, serrata, serraturis rubro-marginatis, superius testè-veridia, infra pallidiora. Petioli rubri, glandulis sessilibus, nonnullisque aculeis praediti. Stipulae angustae margine glanduloso-ciliatæ. Pedunculi glabri, solitarii. Tubus calycis oblongo-ovatus, glaber, aliquando coloratus. Lacinie calycis integerrimæ, ovato-lanceolatae, apice dilatatae, intus et limbo tomentosæ, coloratæ. Petala quinque, obcordata, post antesis, statim, pallide rosea, circiterque a medio usque ad unguem, gradatim albedo-picta; postea, colore purpurascens saturata. Fæcetes pyriformes, glabri, rubri vel aurantiaci, nitidi. Duntaxat inermes. (N.)